

VERTRÄGLICHKEITSLISTE AQ-10[®] WG mit FUNGIZIDEN



Februar 2011

Wirkstoff	Handelsname	Verträglichkeit
AZOXYSTROBIN	QUADRIS	⊗
<i>Bacillus subtilis</i>	SERENADE	☺ +++
BENALAXYL	verschiedene	☺ +++
BITERTANOLE	PROCLAIM	☺ +++
BORDEAUX MIXTURE	verschiedene	☺ +++
BOSCALID	CANTUS	☺ +++
BUPIRIMATE	NIMROD	-
CAPTAN	verschiedene	⊗
CHLOROTHALONIL	DACONIL	⊗
COPPER HYDROXIDE	KOCIDE/HELIOCUIVRE	☺ +++
COPPER OXYCHLORIDE	verschiedene	☺ +++
CYAZOFAMID	MILDICUT	☺ +++
CYMOXANIL	CURZATE 50%	☺ +++
CYPROCONAZOLE	ATEMI/CADDY	☺ +++
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	⊗
DICHLORAN	verschiedene	-
DIFENOCONAZOLE	SCORE	-
DIMETHOMORPH	FORUM 50 WP	+
DITHIANON	DELAN	⊗
DODINE	SYLLIT	⊗
FAMOXADONE	EQUATION PRO	⊗
FENAMIDONE	ELICIO	☺ +++
FENARIMOL	RUBIGAN	☺ +++
FENBUCONAZOLE	INDAR	-
FENHEXAMID	TELDOR	⊗
FLUAZINAM	OHAYO	☺ +++
FOLPET	verschiedene	⊗
FOSETYL-ALUMINIUM	ALIETTE 80%	☺ +++
IMAZALIL	DECCOZIL	-
IPRODIONE	ROVRAL	☺ +++
IPROVALICARB	MELODY COMPACT	☺ +++
KRESOXIM METHYL	STROBY	⊗
LIME SULPHUR	POLICALCIO	-
MANCOZEB	DITHANE DG	⊗
MANEB	many	⊗
MEPANIPYRIM	FRUPICA	☺ +++
MEPTYLDINOCAP	KARATHANE STAR	⊗
METALAXYL	RIDOMIL	☺ +++
METIRAM	POLYRAM DF	⊗
MYCLOBUTANIL	THIOCUR	☺ +++
PENCONAZOLE	TOPAS	☺ +++


Wirkstoff	Handelsname	Verträglichkeit
PROCHLORAZ	verschiedene	-
PROPAMOCARB	PREVICUR	-
PROPICONAZOLE	TILT	☺ +++
PROPINEB	ANTRACOL	☹
PROQUINAZID	TALENDO	☺ +++
PYRIMETHANIL	SCALA	☺ +++
QUINOXYFEN	ARIUS	☺ +++
SPIROXAMINE	PROSPER	☺ +++
SULPHUR	verschiedene	☹
SULPHUR + TERPENIC ALCOHOL	HELIOSOUFRE	☹
TEBUCONAZOLE	FOLICUR	☺ +++
TETRACONAZOLE	DOMARK	-
THIOPHANATE-METHYL	verschiedene	☺ +++
THIABENDAZOLE	verschiedene	-
THIRAM	verschiedene	☹
TOLCLOFOS-METHYL	verschiedene	-
TRIADIMENOL	BAYFIDAN	☺ +++
TRIFLOXYSTROBIN	FLINT	☹
TRIFORINE	RUBIGAN	☺ +++
ZINEB	verschiedene	☹
ZIRAM	verschiedene	☹
ZOXAMIDE	ELECTIS R	☺ +++

ERKLÄRUNG

☺ +++	Verträglich als Tankmischung , ohne deutliche Verminderung der Keimfähigkeit von <i>Ampelomyces quisqualis</i> .
+	Eingeschränkt verträglich , eine vertretbare Verminderung der Keimfähigkeit der Sporen von <i>Ampelomyces quisqualis</i> ist zu erwarten. Die Ausbringung von AQ-10 [®] _{WG} mit diesen Fungiziden muss innerhalb von 30 Minuten nach Ansetzung der Spritzbrühe erfolgen.
☹	NICHT verträglich , diese Fungizide nicht mit AQ-10 [®] _{WG} mischen. Die Anwendung von AQ-10 [®] _{WG} muss mindestens 5 Tage vor oder 5 Tage nach der Anwendung dieser Fungizide erfolgen.
-	Keine Daten verfügbar

Hinweis:

Alle Fungizide wurden mit Konzentrationen nach den Angaben der Hersteller getestet. AQ-10[®]_{WG} niemals mit dem konzentrierten Fungizid mischen, sondern ausschließlich mit dem bereits verdünnten Fungizid mischen. Getestet wurden die Handelsprodukte der Fungizide und nicht die Wirkstoffe. Andere Formulierungen als die oben aufgeführten Handelsprodukte können mehr oder weniger Einfluss auf die Keimfähigkeit und damit Wirksamkeit von AQ-10[®]_{WG} haben. Im Falle von Mehrfachmischungen sollte die Verträglichkeit des Fungizides mit der größten Nebenwirkung auf AQ-10[®]_{WG} in Betrachtung gezogen werden. Diese Auflistung ist für internationale Zwecke erstellt worden. Einige der oben genannten Produkte sind in einzelnen Ländern bzw. Kulturen nicht zugelassen. Jegliche Haftung für Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung der in dieser Liste genannten Produkte wird abgelehnt.

	Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG Carl-Zeiss-Straße 14-18 D-65520 Bad Camberg Tel.: (+49) 06434-905510-0 Fax: (+49) 06434-905510-99 e-mail: info@intrachem-bio.de www.intrachem-bio.de
---	---